

本經序疏要

本經序疏要目錄

卷一

療風通用一

風眩二

頭面風三

中風腳弱四

久風溼痺五

賊風攣痛六

暴風瘙癢七

傷寒八

大熱九

勞復十

溫瘧十一

卷二

中惡十二

霍亂十三

轉筋十四

嘔哕十五

大腹水腫十六

腸澼下痢十七

大便不通十八

小便淋十九

小便利二十

溺血二十一

卷三

消渴二十二

黃疸二十三

上氣欬嗽二十四

嘔吐二十五

痰飲二十六

宿食二十七

腹脹滿二十八

心腹冷痛二十九

腸鳴三十

卷四

心下滿急三十一

心煩三十二

積聚癥瘕三十三

鬼疰尸疰三十四

驚邪三十五

癰癧三十六

喉痛三十七

噎痛三十八

卷五

鰓三十九

齒痛四十

口瘡四十一

吐唾血四十二

鼻衄血四十三

鼻齁四十四

耳聾四十五

鼻息肉四十六

目赤熱痛四十七

目膚瞤四十八

聲喑啞四十九

面疔炮五十

髮禿落五十一

滅瘢五十二

金創五十三

卷六

踉折五十四

瘀血五十五

火灼五十六

癰疽五十七

惡瘡五十八

漆瘡五十九

癰瘤六十

癰瘡六十一

五痔六十二

脫肛六十三

蠶六十四

蛇蟲六十五

寸白六十六

卷七

虛勞六十七

陰痿六十八

陰癰六十九

囊溼七十

洩精七十一

好眠七十二

不得眠七十三

胛痛七十四

婦人崩中七十五

月閉七十六

無子七十七

安胎七十八

墮胎七十九

難產八十

卷八

產後病八十一

下乳汁八十三

中蠱八十三

出汗八十四

止汗八十五

驚悸心氣八十六

肺痿八十七

下氣八十八

蝕膿八十九

女人血閉腹痛九十

女人血氣歷腰痛九十一

女人腹堅脹九十二

解百藥及金石等毒九十三

服藥食忌九十四

凡藥不宜入湯酒九十五

序曰班氏藝文志謂醫經者原人血脈經絡骨髓陰陽表裏以起百病之本死生之分而用度鍼石湯火所施調百藥齊和之所宜經方者本草石之寒溫量疾病之淺深假藥味之滋因氣感之宜辨五苦六辛致水火之齊以通閉解結反之於平蓋自是醫經經方遂分連絡之者本草經則其樞紐矣乃志不載其書然帝紀平帝元始五年徵天下通知逸經古記天

文厯算鐘律小學史篇方學本草及以五經論語孝經爾正教授者所在爲駕一封軺傳遣詣京師至者數千人樓護傳護少隨父爲醫長安誦醫經本草方術數十萬言世不忽其書故習而傳之者代不乏人其得至今存者惟梁貞白先生陶氏書爲最古今案其書旣歷載本經總序於前復患諸藥一種雖主數病而性理有偏著立方或致疑混赴急抄撮恐不皆得研究故將本經序大病之主已下一節循其所列剖而析之分爲八十三項件繫主治藥於下方贅之序末是陶氏實注本經而得本經與醫經經方連絡交會處矣予治仲景書旣由不明藥物主病之所以

然用力本經有本經疏證續疏之作矣繼治孫真人
王太守書覺與仲景書猶未相承接遂立志究竟病
名古今相沿之準病證彼此不侔之故而證以藥物
主治之由得是編以爲鵠反覆尋繹參互研訂然後
知一證也隸之此病則屬虛隸之彼病更屬實一藥
也投之彼病則逐實投之此病反補虛於仲景書以
此推其緒於孫真人王太守書以此要其歸蓋自是
而漢人唐人醫學醫經經方旨趣得連爲一貫焉篇
中附北齊徐氏唐蘇氏蜀韓氏宋唐氏所增其精詣
幾與陶氏埒而徐氏所續九項實有裨補證明之功
亦隨例詮釋而不削也道光二十年九月五日武進

鄒澍序

貞白先生名宏景梁時隱居茅山自號華陽隱居
實始集別錄附入本草經中徐氏名之才北齊尚
書令封西陽王著藥對蘇氏名恭顯慶中與長孫
無忌許敬宗等修定本草李勣表上之今名唐本
草韓氏名保昇孟蜀重廣唐本草并稍增注釋名
蜀本草掌氏名禹錫宋嘉祐時奉詔重修本草名
嘉祐補注本草唐氏宋大觀時蜀人取諸家本草
彙而集之竝采入經史中言醫事隨類附入名證
類本草

本經序疏要卷之一目錄

序例

療風通用一

風眩二

頭面風三

中風腳弱四

久風溼痹五

賊風攣痛六

暴風瘙癢七

傷寒八

大熱九

勞復十

溫瘧十一

本經序疏要卷之一

武進鄒澍學

序例

謹按諸藥一種雖主數病而性理亦有偏著立方之日或致疑混復恐單行經用赴急抄撮不必皆得研究今宜指抄病源所主藥名便可於此處療若欲的尋亦兼易解其甘苦之味可略有毒無毒易知惟冷熱須明今依本經別錄注於本條之下其有不宜入湯酒宜入湯酒者亦條於後

唐本以朱點爲熱墨點爲冷無點爲平多有差悞宋人於逐藥之下依本經別

錄而注焉

凡藥稟賦絕類則功用廣博然推其端緒要有歸著

譬如麻黃其異在所產之地冬不積雪則其歸著在

鼓發陽氣衝散陰邪故凡束縛難伸之風

賊風

蔽錮

盛熱之寒

傷寒

乍揚更抑之熱

溫瘧

迫隘不順之氣

上氣欬氣

皆所能療誠得謂一種可主數病矣然不能治筋骨
懈弛之風陽氣漏泄之寒鼓蕩不羈之熱隨火沖逆
之氣稽其效曰出汗亦僅能令霾中見睨不能令旱
處致霖曰下氣卻祇能於橫中闢道不能於直下鑿
渠又可謂性理有偏著否耶太陽病項背強几几汗
出惡風者桂枝加葛根湯反無汗惡風者葛根湯用
麻黃不用麻黃其別在汗欬而脈浮者厚朴麻黃湯
沈者澤漆湯用麻黃不用麻黃其別又在脈立方之

日不洞曉是理易致疑混陶氏序肘後百一方云常
居閑佚乃可披檢方書或從祿外邑將命遐征或宿
直禁閨晨宵隔絕或急速戎陣城柵嚴阻忽遇疾厄
拱手相向搢紳君子且然何況貧家野居能不向單
行經用赴急抄撮以求活此時而欲研究方書探討
經義證其非是豈特不能且不暇矣爲此編者筆墨
省減病名旣得原委藥味遂可別擇循證求病因病
得藥從藥檢宜誠可謂探之囊笥庸豎均可成醫者
嗟夫世風遞易遵守殊規徒知寒可攻熱熱得療寒
補概益虛泄能除滿欲適燕而北其轅固不爲非是
殊不知自吳直往定抵海濱從滇徑徂輒歸西域遂

致軻發坦途詣終茅塞惟古人所指示曲盡攸宜縱使羊腸鳥道循是遄征必可屆四通八達此昔日之僻徑卽今日之廣衢而今日所謂廣衢乃金元已來所別闢也甘苦之義其旨淵微冷熱之宜其情直遂注此於下相得益彰意簡要而用專精矣

療風通用

防風溫。主大風頭眩痛風行周身骨節疼痛痹煩滿

防已平溫。療風腫及中風手足攣急

秦艽平微溫。療風無問久新通身攣急

獨活平微溫。治中諸風溼冷奔喘逆氣皮膚苦癢

藥性

論

芎藭溫。主中風入腦頭痛寒痺

羌活平微溫。主賊風失音不語多癢血癩藥性論

麻黃溫微溫。治身上毒風痛痺皮肉不仁藥性論

蜀本鹿藥溫。主風血去諸冷益老起陽

天麻平。治諸風溼痺四肢拘攣

海桐皮平。主要腳不遂頑痺腿膝疼痛海藥

蚬祁

威靈仙溫。主諸風宣通五藏去腹內冷滯心隔痰

水

藥對楓香平治癰癢毒臣

薏苡仁微寒主風筋攣急屈伸不得君。主風溼痺

下氣

萎蕤平治中風暴熱不能轉動者君

巴戟天微溫治風邪氣君。治一切風日華

側子大熱治溼風大風拘急使。治冷風溼痺大風

筋骨攣急藥性論

鼈頭血治口僻臣

山茱萸平治風氣臣。主頭風風氣去來鼻塞目黃

耳鳴面皤

淡竹瀝及葉大寒主風癰疾臣

牛膝平主風攣急君

細辛溫主風攣急君。主風溼痺痛死肌

菖蒲溫君并桂心大熱吹鼻中主風瘖君

梁上塵微寒以小豆大吹鼻中治中風使

葛根平治暴中風臣。治金創中風瘓欲死者煮汁飲

之口噤不開多服生葛根自愈

肘後

白鮮皮寒治風不得屈伸風熱臣。主頭風。治一

切風痺筋骨弱乏通小腸水氣

日華

白薇大寒治暴風熱四肢急滿不知人臣

證類

天蘗冬平大寒。主諸暴風溼偏痺強骨髓

附子溫大熱。主脊風寒

杜若微溫。主風入腦戶頭腫痛多涕淚出

麥蘗冬平微寒

羚羊角溫

應作寒

微寒。治一切熱毒風攻注

藥性論

主

中風筋攣附骨疼痛生摩和水塗腫上

孟詵

犀角寒微寒。散風毒

藥性論

治中風失音熱毒風

日華

藁本溫微寒。除風頭痛。能治一百六十種惡風

鬼疰流入腰痛冷能化小便通血

藥性論

天雄溫大溫。主大風寒溼痺歷節痛拘攣緩急

黃芪微溫。主大風癰疾

蒺藜子溫微寒。治諸風癰瘍破宿血

藥性論

菴耳實溫葉微寒。主風頭寒痛風溼周痺四肢拘

攣痛惡肉死肌

菊花平。主四肢游風利血衄

日華

狗脊平微溫。治男子女人毒風輭腳邪氣溼痹。藥性論

莽艸溫。主風頭癢可用沐勿令入眼

柏子仁平。主風溼痺。治風潤皮膚。日華

蔓荊子微寒微溫。治賊風。藥性論

當歸溫大溫。主惡血內塞中風痙汗不出

烏喙微溫。主風溼寒熱歷節掣引腰痛不能行步

草薢平。主冷風痺腰腿不遂手足驚掣。藥性論

躑躅溫。主賊風在皮膚中淫淫痛

欒荊溫。主大風頭面手足諸風

辛夷溫。主風頭腦痛

小天蓼溫。主一切風虛羸冷手足痺疼無論老幼輕重浸酒及煮汁服之

乾蝎溫。療諸風癱瘓及中風半身不遂口眼喎斜語澀手足抽掣

烏蛇溫。主諸風瘙癢瘰癧皮膚不仁頑痺

天南星溫。主中風除痰麻痺下氣破堅積

烏頭溫大熱。主中風惡風洗洗出汗除寒溼痺

白花蛇溫。主中風溼痺不仁筋脈拘急

酸棗仁平。主筋骨風研末作湯服之

藥性論

鼠粘子平。除風傷

牛黃平。療中風失音口噤

日華

枳殼微寒。主風癢麻痺通利關節

牡荊子微寒平。根主心風頭風肢體諸風解肌發

表

唐本引別錄

風之病人也大率有三有感而即發者有既入人身盤旋氣血間久乃成病者有人身陽氣自應風化爲患者感而即發如傷寒溫熱時氣等類是已既入人身盤旋氣血間久乃成病如風眩頭面風等類是已此篇大旨爲諸病提綱挈領獨於人身陽氣自應風化爲病者加詳何謂人身陽氣自應風化蓋陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之則陰陽固互相爲用矣然不有陰氣凝聚陽在內不得出奮擊爲雷霆者

乎不又有陰氣凝聚陽在外不得入周旋不舍而爲風者乎是故風者陽氣之變眚也其卦爲巽巽者陰初凝而完聚陽始退而矯強強者力不能散聚之紉密聚者偏不受強之提撕於是相搖相曳相摩相盪而周旋不舍焉而抑揚飄驟焉必得雨而風乃息雨固陰陽之既翕而化焉者也故夫人身之陽在上則欲其與陰化而下歸在下則欲其化陰而上出設使在上不與陰化在下不能化陰斯陽亢無以升降於是爲出柙之虎失繫之猿而窮而無歸咆哮狡獪百變不已窺篇中大意陽之鬱者伸之陽之勁者緩之陰之結者破之陰之竭者濡之隨其所在而澤陽因

其所近而招陰增膏以定火之炆溉水以拯木之枯
總不出用陰和陽一語就病以徵藥卽藥以審病紛
紜膠擾之中未始不可隨處洞徹源委也

風眩

菊花平。主風頭眩腫痛目欲脫淚出

飛廉平。主頭眩頂重

躑躅溫

虎掌溫微寒。主風眩。主風眩目轉

藥性論

杜若微溫。主風入腦戶頭腫痛多涕淚出眩倒目眊

眊

茯神平。療風眩風虛

茯苓平

白芷溫。主頭眩目癢

鳴頭平。主頭風眩顛倒癇疾

蜀本伏牛花。主風眩頭痛
藥對芎藭溫臣

防風微溫主頭眩顛倒火風溼痹臣。主大風頭痛

惡風

人蔘微溫主頭眩轉君

兔頭骨平臣。主風眩顛疾

證類蔓荊實微寒。主風頭痛腦鳴目淚出

薯蕷溫平。主風頭眼眩

求溫。主風眩頭痛目淚出

蕤無溫。頭中久風風眩

陽在上不與陰化在下不能化陰均之風也何以在下之風有腸風胃風則爲飧洩也又有風秘風燥則爲便艱也在上之風有卒仆無知痰涎湧逆也又有風頭眩痛涕洟唾淚也此不特有淺深之殊抑亦有開閉之異蓋陰之錮者陽必鬱則陰固錮陽而陽亦燥陰也陰之漏者陽必動則陰固背陽而陽復迫陰也故夫閉者益閉開者愈開閉者之致斃是陰竭陽亡開者之及危乃陰離陽決雖然閉之弊斷有甚於開試思風頭眩痛非卒倒無知之輕者乎痰涎湧逆

非涕洟唾淚之甚者乎然參繹前篇與此篇義旨又有以知閉者宜醒陰導陰以濟陽開者宜順陰和陰以平陽爲同中之異矣順陰和陰以平陽柰何試以燭施則淚垂波蕩則舟旋轉證之夫燭施淚垂者咎在陽而不在陰波蕩舟旋者咎在陰而不在陽但風息則非特燭不施卽波亦不蕩矣是豈不可并合而論然不有膏不堅而燭垂淚者乎不有水激搏而舟旋轉者乎水激搏而舟旋轉是地勢之傾欹也膏不堅而燭垂淚是氣候之過暖也療風無藉乎崇土此篇偏疊隸以蕩朮薯蕷療風何資於滲利此篇乃竝列以茯苓荻荅而菊花之苦平而降蔓荊之辛寒而升

朮之苦溫而守性殊楚越而收淚之功則同其可謂
順陰氣使就下和陰氣使歸壑平陽氣使甯謐者非
耶攷仲景治眩多著意於水與飲故苓桂朮甘湯真
武湯五苓散澤瀉湯均不得謂爲治風則風眩之必
兼治水從可識矣

頭面風

芎藭溫。除面上游風去來目淚多涕唾忽忽如醉

薯蕷溫平。主頭面游風

天雄溫大熱。療頭面風去來疼痛

山茱萸平微溫。除面上瘡主能發汗

藥性論

莽艸溫

辛夷溫。治面腫引齒痛

牡荊子溫

蔓荊子微寒平溫。久服令人光澤脂緻

藁本溫微溫微寒。長肌膚悅顏色辟霧露潤澤可作

沐藥面脂

蘼蕪溫

藁耳溫

蜀本何首烏微溫。療頭面風

藥對阜茨溫主風眩使

巴戟天微溫主頭面風君。療頭面游風

白芷溫主頭面風臣。可作面脂

防風溫主頭面來去風氣臣

蜂子微寒微溫。主面目黃久服令人光澤好顏色

證類杜若

藁耳實溫葉微寒

頭面風亦在上之風也其主治多用溫升核以陽在上不與陰化之義相悖否夫豈知頭面風固在上其所以然卻在下哉靈樞邪氣藏府病形篇黃帝曰首面與身形屬骨連筋同血合氣天寒則裂地凌冰或手足懈惰然而其面不衣何也岐伯對曰十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目而爲睛其別氣走於耳而爲聽其宗氣

土出於鼻而爲臭其濁氣出於胃走脣舌而爲味其氣之津液皆上燠於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒不能勝之也是豈非其末在上其本在下歟巢氏曰頭面風者諸陽經脈爲風所乘也諸陽經脈上走於頭面運動勞役陽氣發洩腠理開而受風謂之首風是豈非招風取中之故歟觀篇中一則曰游風再則曰去來詎非其病旣不常在亦不竟除來本無期去亦無跡其來也或目淚或涕唾多或忽忽如醉或頭痛或生瘡或腫或不光澤或面目黃色其去也倏然若失則其陽氣暫弛而病生稍張而病罷猶可不使陽化在下之陰令上出而爲光澤脂緻以長肌膚

潤顏色乎是其於風眩一則水乘風以上激一則火
委頓而不上炎烏可同日語也然機關既在下何以
不病於下而病於上夫適所謂陽不固而非陽衰陽
衰則病於下矣然至用天雄不可不謂陽衰是則有
說焉夫遠行勞力汗出於腎經有明文運動勞役而
至陽氣發泄不能不謂傷自腎始而陽之發泄有多
端其已發而未泄者則因其上而越之矣若已發已
泄繼踵而不止慄悍而難禁者能不按而收之乎若
發泄過甚根柢將傾者能不因其衰而彰之乎夫固
難以一途論也充陽以運陰滯散火以靖陽氣息風
以奠陽位和陰以達陽光名曰治陽實以治陰中之

陽名曰治下實以使自下而上推其變而會其元古人之用意密矣哉

中風腳弱

石斛平。主腳膝疼冷痺弱

石鍾乳溫。療腳弱疼冷下焦傷竭

殷孽溫。主腳冷疼弱

孔公孽溫。主腰冷膝痺毒風

藥性論

石硫黃溫。大熱。主腳冷疼弱無力

附子溫。大熱。腳弱冷疼不能行步

豉寒。主虛勞喘吸兩腳冷疼

丹薺微寒。腰脊強腳痺除風邪留熱

五加皮溫微寒。療躄小兒不能行。女人腰脊痛。兩腳

疼痺。主賊風傷人。輒腳齮腰。

藥性論

竹瀝大寒

大豆平。豆黃主溼痺膝痛。

孟詵

天雄溫大溫。主關節重不能行。步除骨間痛。

測子大熱。風痺歷節。胛腳疼冷。

藥性論木防已平。治攣急。臣。治男子肢節中風毒風不語。

主散結氣擁腫。

藥性論

獨活微溫。主腳弱。君。主手足攣痛勞損。

藥性論

松節溫。治腳膝弱。君。主久風風虛。腳痺疼痛。

牛膝平。治痛痺。治腰膝輒怯冷弱。

藥性論

證類
胡麻平

中風腳弱之候與頭面風適相對照其治自應推在上之陽回入陰中以強之已耳乃復列入性寒通利者過半是何故歟夫既曰弱則非拘急攣縮可比卻甚有似於痿既曰腳則非頭項身體盡然又不全係於風何則風性善行不能但駐一處弱者筋弛而不束骨也生氣通天論曰溼熱不攘大筋縵短小筋弛長縵短爲拘弛長爲痿又曰有傷於筋縱其若不容痿論曰心氣熱則下脈厥而上上則下脈虛虛則生脈痿樞折挈筋縱而不任地果爾則行溼以去熱使陰得以上濟通血以導氣使陽得以下蟠而自上下

下之化通矣又烏得但恃引火回陰之一端耶然則直曰痿可矣何得命之曰中風夫風固陰性凝聚陽在外不得入則與之周旋不舍而爲者耳特凝聚之中果何氣哉試思氣交之今天氣迷蒙地氣抑遏土木生潤階礎流漿非陰之凝聚溼與熱耶而旋即雷雨洊至必首御以風是風非溼與熱凝聚而生者耶乃是時也膠柔弦弛任是堅脆之物必轉溼潤焉則所謂中風腳弱非飄揚淒淒之風亦非掀天刮地之風直是醞釀於溼與熱中欲出而未得出欲息而不得息者彼痿則雖間亦有挾溼如所謂肉痿者餘則均係熱灼陰消皮毛血脈肌肉筋膜骨髓直乾枯焉

耳此風與痿之所攸分卽本書不載痿之由已再覈
篇中凡性溫者所主必云冷云痛間有性平性寒者
所主亦有疼與冷焉是其轉移陰陽之浮滯散發陰
陽之抑鬱暢達生氣之畱連撥正經脈之違逆具握
化機力專效捷自有常理於中而非可以常情測者
尤宜具眼觀也

久風溼痺

菖蒲溫平。主風寒溼痺

茵芋溫微溫。諸關節風溼痺痛

天雄溫大溫。主大風寒溼痺歷節痛拘攣緩急

附子溫大熱。主寒溼踈痺拘攣膝痛

烏頭溫大熱。除寒溼痺。

細辛溫。主風溼痺痛死肌。

蜀椒溫大熱。逐骨節皮膚死肌寒溼痺痛。

牛膝平。主寒溼痿痺。

天薺冬平大寒。主諸暴風溼偏痺。

朮溫。主風寒溼痺。

丹薺微寒。除風邪留熱。

石龍芮平。主風寒溼痺心煩邪氣。

茵陳蒿平微寒。主風溼寒熱邪氣。

松葉溫。主風溼瘡生毛髮。

松節溫。主百節久風。

側子大熱。主風痺歷節

藥對 薏苡仁微寒主中風溼痺筋攣君

躑躅溫治風使。主賊風在皮膚中淫淫痛

柏子仁平主風溼痺君。益氣除風溼痺

獨活微溫治風四肢無力拘急君

證類 天薺冬平大寒

菴耳實溫葉微寒。主風溼周痺四肢拘攣痛

蔓荊子微寒微溫。主溼痺拘攣

痺之訓為冷疾荀子解蔽篇注為溼病說文則風者其冷溼之

所化歟是蓋不然若本無風而風為冷溼所化則痺

論不得云有風氣勝者矣然則此篇但云風溼而不

云寒則寒者得無風溼之所化歟是又不然痺論云
風寒溼三氣雜至合而成痺則爲病之由固三者兼
受矣曰雜至謂錯雜而至不拘孰先孰後也曰勝謂
其氣較之他氣爲盛也曰行曰痛曰著則病之情狀
已該其中矣然則篇中以緩急淫淫周痺爲風勝以
拘攣歷節偏痺爲溼勝以痛爲寒勝而治風以散治
寒以熱治溼以滲可矣何爲乎寒熱雜陳通補互用
豈痺亦有屬虛屬熱者哉夫風爲陽寒爲陰溼爲陽
中之陰則邪既有陰陽矣何況人身亦有體質之不
齊陰陽之偏旺氣候之勝復而感觸動盪於其間豈
能執一以爲則而無藏府之違從氣血之消長耶故

曰痛者寒氣多也病久入深營衛之行澀經絡不疏則不通皮膚不營則爲不仁陽氣少陰氣多與病相益故爲痺寒陽氣多陰氣少病氣勝陽遭陰故爲痺熱其逢溼甚者陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也又曰痺在於骨則重在於脈則血凝不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在於皮則寒具此五者則不痛凡痺之類逢寒則急逢熱則縱據此則又豈得按其始以定治乎然則何以不及五藏諸痺之治夫篇中除煩平喘通利血脈養營定驚伸引筋骨下氣止嘔之物亦何嘗闕顧謂不治五藏痺耶或謂仲景云風之爲病當半身不遂或但臂不遂者此爲痺

其辨嚴矣何以篇中治痺之物盡治風之物夫此則邪之力有大有小耳譬諸寇盜力大者徑情直行無敢與忤力小者誘引相得萃於一隅然正其治化之端通其出入之道招徠其脅從殲戮其巨魁剿大剿小一也焉用別乎特風多猝然而至痺每積漸乃成故以久風溼痺標名非謂更有驟風溼痺相對照也

賊風攣痛

茵芋溫微溫○療諸關節風溼痺痛

附子溫大熱○主寒溼踈痺拘攣膝痛

側子大熱○治冷風溼痺大風筋骨攣急

麻黃溫微溫○主五藏邪氣緩急風脅痛

芎藭溫。主寒痺筋攣緩急

杜仲平溫。治腎勞腰脊攣偃

日華

葶藶平。主脊背痛強骨節風寒溼周痺

狗脊平微溫。主脊背強機關緩急周痺

白鮮皮寒。主溼痺死肌不可屈伸

白芨平微寒。主賊風鬼擊痲緩不收

菴耳溫。主風溼周痺四肢拘攣痛

豬椒溫。主風寒溼歷節疼

證類石斛平。逐皮膚風痺

藥性論

漢防已平溫。主中風手足攣急

靈樞賊風篇黃帝曰夫子嘗言賊風邪氣令人病今

有不離屏蔽不出室穴卒然病者何也岐伯對曰此皆嘗有所傷於溼氣若有所墮墜惡血留於內而不去卒然喜怒不節飲食不適寒溫不時腠理閉而不通其開而遇風寒則血氣凝結與故邪相襲而爲寒痹其有熱則汗出汗出則受風雖不遇賊風邪氣必有因加而發焉帝曰夫子之所言皆病人所自知也其毋所遇邪氣又毋怵惕之所志卒然而病者何也惟因有鬼神之事乎岐伯對曰此亦有故邪留而未發因而志有所惡及有所慕血氣內亂兩氣相搏其所從來者微視之不見聽而不聞故似鬼神據此則賊風者卒然而發正與風溼痹之積久乃成者相反

矣顧賊風未必盡爲攣急攣急未必盡由賊風則賊風攣急者其如飛尸如鬼擊不假有因卒然而發之攣急歟然前此種種諸風篇未必竟無攣急此篇種種諸證又未嘗皆攣急謂前此諸攣急非卒然而得則可謂今此卒然得者雖不攣急亦得命爲賊風攣急可乎然覈此篇僅痺緩不收皮肌風痺兩者無攣急餘則不可屈伸機關緩急緩急風脅痛關節風溼痺痛皆攣急也矧痺緩不收上明著賊風鬼擊耶惟卒然得者與不卒然得者所主藥物大同小異是則宜參究耳雖然論病則當嚴別所由論治卻宜實據現在使風以陰陽不合化而病者必推前此五載十

年曾患感冒以爲據是猶歷家之推歷元縱有合而無相干涉也但是見氣之壅滯則調其氣見血之泣澀則和其血見痰之涌逆則利其痰見溼之阻礙則行其溼風之由外入者鼓舞元氣以驅而散之風之由內成者提曳陰陽以和而息之縱是驟然而得積久而成能外是哉且前此諸篇有和血者矣有行溼者矣而未宣明其所以然得此賊風篇一證而後所以和血所以行溼乃能瞭如指掌則所謂喜怒不節飲食不適寒溫不時及志有所惡或有所慕檢前此諸篇亦未嘗不有互相脗合者總在臨時進退推移以求其合而無失之拘執無失之附會斯可矣

暴風瘙癢

蛇牀子平。主大風身癢煎湯浴之。

藥性論

蒴藿溫。主風癢癰瘡身癢溼痺。

烏喙微溫。主丈夫腎溼陰囊癢。

疾藜子溫微寒。主身體風癢。

景天平。主風癰惡癢。

茺蔚子微溫微寒。莖主癰瘡癢可作浴湯。

青箱子溫寒。主邪氣皮膚中熱風瘙身癢。

楓香脂平。主癰瘡風癢。

藜蘆寒微寒。主頭瘍疥瘙惡瘡。

蜀烏蛇平。主諸風瘙癰疥皮膚不仁頑痺諸風。

藥對

葶藶子寒主暴風使。主暴中風熱癰癢。

枳實微寒主大風在皮膚中癢君。主大風在皮膚

中如麻豆苦癢

殼莖主身癰癢煮水洗臣

證類

枳殼微寒。主風癢麻痺。

仲景云太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少脈微面反有熱色者未欲解也以其不得小汗出身必癢又云寸口脈遲而緩遲則爲寒緩則爲虛營緩則爲亡血衛緩則爲中風邪氣中經則身癢而癰癢又云脈浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相搏風強則爲癰癢身體爲癢癢則爲泄風久爲痂癩氣

強則爲水難以俯仰巢氏云游風在於皮膚逢寒則身體疼痛遇熱則瘙癢又云人身皮膚虛爲風邪所折則起癰癰據是則風瘙癢證均係營衛有邪或寒爲熱折熱爲寒折欲內不得欲出不能故耳夫心主營肺主衛熱折者病關於心營故血脈不咸而爲癰寒折者病關於肺衛故氣機沸逆而爲水此篇中所列除諸治下體溼癢外餘皆行心肺之物矣然行氣者倍多利血者絕少則以諸痛癢瘡雖屬心火但癢究在皮膚皮膚間氣旣行病氣已難駐趾任是血脈間尙有邪氣涌出亦可隨氣而行竟使不能更聚惟其瘙癢本涉於陰借陽分爲藏納者則宜從陽分透

達其陰滯以爲掃地無餘之計且病原係暴起則若是者本無多耳要之暴風瘙癢與賊風變急均是暴病而一病於陽一病於陰病於陰故用搜逐之物多病於陽故用疏利之物多已屬兩相對待又相并而對待夫久風溼痺爲卒然而得積久乃成之規模治風者七篇其脈絡條理如此統會而觀之則非特久暫之分可明卽上下內外之別均瞭如指掌矣

傷寒

麻黃溫微溫○中風傷寒發表出汗去邪熱氣

葛根平○傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理

杏仁溫○時行頭痛解肌心下惡

前胡微寒。傷寒寒熱推陳致新。

芫胡平微寒。傷寒心下煩熱諸痰熱結實胃中邪逆大青大寒。時氣頭痛大熱口瘡。

龍膽寒大寒。時氣溫熱熱洩下利。

芍藥平微寒。時行寒熱。

薰草平。主傷寒頭痛上氣腰痛。

升麻平微寒。時氣毒癘頭痛寒熱。

牡丹寒微寒。時行頭痛客熱。

虎掌溫微寒。

朮溫。

防已平溫。傷寒寒熱邪氣利大小便。

石膏微寒大寒。○時氣頭痛身熱

牡蠣平微寒。○傷寒寒熱驚志怒氣

貝母平微寒。○傷寒煩熱淋瀝邪氣

鼈甲平

犀角寒微寒。○傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣

羚羊角寒微寒。○傷寒時氣寒熱熱在皮膚溫風注毒

毒在骨間

葱白平。○傷寒頭痛

豉寒。○傷寒頭痛寒熱煩躁滿悶

人溺寒。○寒熱頭疼溫氣

芒消大寒。○主時疾壅熱

藥性論

生薑微溫。傷寒頭痛鼻塞

藥對 栝樓寒主煩熱渴發黃臣。莖葉療中熱傷暑

葱根寒主頭痛發表臣

大黃大寒使。溫瘴熱疾利大小便

日華

雄黃平君

白鮮皮寒主時氣出汗臣。主時行腹中大熱飲水

大呼欲走

射干微溫治時氣病鼻塞喉痹陰毒使

茵陳蒿平微寒主發黃臣。通關節去熱滯傷寒用

之

拾遺

梔子大寒臣。主時疾除熱及消渴口乾目赤腫痛

藥性論

青竹筴微寒主頭痛臣。溫氣寒熱吐血崩中筋溢
寒水石大寒主五內大熱臣。主時氣熱盛五藏伏
熱胃中熱煩滿止渴

水牛角平主溫病使。療時氣寒熱頭痛

紫草寒主骨肉中痛臣

藁耳微寒臣。主中風傷寒頭痛

孟詵

虎骨平主傷寒。療傷寒溼氣

證類知母寒。療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣

半夏微寒。主傷寒寒熱心下堅

仲景纂傷寒論用藥幾至百品今且未得其半果足

盡傷寒之治耶殆有說焉傷寒論是曲鬯其流而此則疏瀹其源也許傷寒論兼證有風溼痺有風眩有水氣有下利有大便難有小便不利有黃疸有欬逆有痰飲有宿食有腹脹滿有腹中鳴有心下急結有心煩有喉痛有吐血有衄血有耳聾有目赤有瘀血有好眠有不得眠一一推明其傳變之由處以確當之治茲則已各分門類可別尋而得矣惟溯其得之之病曰傷寒曰時行曰中風曰溫疫曰寒熱曰溫瘴曰溫病曰傷暑以別其受病之故而推其始得病時所隸之證曰頭痛曰心下惡曰胃中邪逆曰大熱口瘡曰熱洩下利曰驚恚怒氣曰淋瀝邪氣曰諸毒氣

曰筋溢曰骨中痛以審定其緣何而連引及是以訂其治則而利導其陰陽馴擾其偏駁使不至傳變無方與傷寒論實互相爲用而適相成者也夫以寒遏陽而陽暴張以熱劫陰而陰驟耗當其正氣未動固不難發越其寒以安陽解散其熱以存陰也無如其來也非一途其宅也非一處何況勾引之者藏匿之者皆人身平昔失職之氣血乃相與合從連衡根株蔓引苟不分崑岡玉石直謂將而必誅則旣患病之人其無愆之陰陽有幾能不決裂潰敗哉故據其源令轉相化誘而使滯者開鬱者解外者徹內者通就其素相入而入因其故相和而和於是不相浹者

不相容者容以致乎陽能納陰陰能附陽而復其
和焉試覈篇中陳藥凡四十一味其未經傷寒論用
者得二十一味參二十一味之性情功用皆在溫暑
瘴疫痰溼毒火中與傷寒之源迥別其傷寒論常用
而篇中闕如者除諸兼證可別尋主治外皆係溫補
填攝之物則亦可悟源異者不可混施以求合流同
者不必引繩以致歧六淫之外加二氣之內戾總在
直據當時無泥陳迹則揚扞疏濬各盡其長耳謂此
篇補傷寒論之闕也可謂此篇闡傷寒論之義也亦
無不可

大熱

凝水石寒大寒。腹中積聚邪氣。皮中如火燒。

石膏微寒大寒。口乾舌焦不能息。

滑石寒大寒。身熱洩瀉。

黃芩平大寒。諸熱。

知母寒。消渴熱中。

白鮮皮寒。時行腹中大熱飲水。

元瀋微寒。狂邪忽忽不知人。

大黃寒大寒。腸間結熱心腹脹滿。

沙瀋微寒。皮間邪熱。

苦瀋寒。除伏熱。

茵陳蒿平微寒。除頭熱。

鼠李根皮微寒

竹瀝大寒

梔子寒大寒。胃心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣

蛇莓大寒

人糞汁寒

白頸蚯蚓寒大寒。傷寒伏熱狂謬大腹黃疸

芒消大寒。五藏積聚久熱胃閉

藥梓白皮寒除熱使。煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮

膚瘙癢

地膚子寒主五內熱利小腹君。主皮膚中熱氣

小麥微寒主胃中熱使。除熱止躁渴咽乾

木蘭皮寒主身大熱暴熱面皯臣。主身大熱在皮膚中去面熱赤皯

水中萍寒主暴熱身癢臣。主暴熱身癢下水氣理石寒君。除榮衛中大熱結熱解煩毒

石膽寒主肝藏中熱臣

牛黃平主小兒熱癰口不開君。主驚癰寒熱熱盛狂瘥

鈴羊角微寒主熱在肌膚臣

垣衣大寒主發瘡。主暴熱在腸胃

白薇大寒臣。主暴中風身熱肢滿忽忽不知人

景天平主身熱小兒發熱驚氣君。主大熱火瘡身

熱煩邪惡氣

升麻微寒主熱毒君。除心肺風毒熱壅

藥性論

龍齒角平主小兒身熱臣。角主驚癇癰瘕身熱如

火

葶藶寒主身暴熱利小便使。主身暴中風熱痹癢

利少腹

藍葉實寒主五心煩悶君。主天行熱狂

日華

蜣螂寒主狂語頭發熱使。主小兒驚癇癰瘕腹脹

寒熱大人癰疾狂易手足端寒

棟實寒作湯浴通身熱主溫病使。主溫疾傷寒大

熱煩狂

荆瀝大寒主胷中痰熱臣。去心中煩熱小兒心熱

驚癇

拾遺

大熱卽傷寒論所謂身熱不惡寒反惡熱者也果爾則應隸之傷寒不得別爲條目且陽明病雖身熱不惡寒反惡熱其始得之一二日必惡寒也然則諸病皆有熱惟此病之熱獨盛他病不足與侔者方可謂大熱歟果爾則仍應諸病爲綱而熱乃其中一證今觀篇中所主均係熱盛而他病生非他病居先而熱續增也故夫大熱者雖有所在之不同所本之或異然終不惡寒無休息縱兼他病然推其故總由此而累及乃得獨標一目自成一證耳觀夫內有所因而

熱獨著於外外有所因而熱獨逼於內上有所因而熱獨伏於下下有所因而熱獨浮於上雖同爲熱而已各殊其分矣何況內者有在腸在藏在胃在肝在心肺在胃中之異外者有在肌膚有在皮間有身癢有發瘡有肢滿之異上者有頭熱有口乾舌焦之異下者有伏熱有洩瀉有大腹黃疸有小便不利之異若不因其輕而揚因其重而減有形者導之於內有邪者瀆形爲汗而但執寒因熱用爲治可乎雖然大熱者火盛也火盛必濟之以水乃篇中病因有緣溼而熱盛者治法有利水而熱除者豈溼與水非但不足以息火之怒而反足以資火之燃耶夫水火之相

濟也必其相和而後能相受不和則兩相拒而不相
下不受則兩相賊而適相殘故病本不盛以相拒而
增以相賊而劇惟導去其相拒相賊者而病於以減
焉非反也所謂適事爲故耳然則均之溼熱也水自
行而火自盛如身熱洩澀者此又何說哉夫身熱洩
澀者垢汙因熱而積於中也垢汙因熱而積於中則
澀者非特可滌垢亦且可洩熱乃垢不去熱又不減
則其故不在流行之水火而在畱著之形質陽無所
入而轉盛陰無所交而自行故其治必使形質能隨
氣化而後氣化得行焉又不可與尋常溼熱竝論也
寒者熱之熱者寒之固經訓也第以謂如火之熯水

水之沃火則非矣何以言之夫人身之陰陽相須以爲生相違而致病設病乎水者以火燠之水未竭則離火而水仍病水已竭則死矣病乎火者以水沃之火未熄則水乾而火仍燃火已熄則亦死矣故治病之道貴乎能使陰陽相入而相濟以成和相入之道無他在乎能與順耳故易大傳曰與入也試覈此篇之旨或全陰以配陽或化陰以從陽或浥水以滋火或迎火以致水陰格陽而陽怒者挾其陰而陽自暢陽蝕陰而陰消者裕其陰而陽自飫甚且引其至故所經行之道而陽通導其至故所舒散之化而陽泰而無一味逆折之意於其間對待而觀之則以熱治

寒之道可知矣推而廣之則宜補而用填塞之方宜泄而行罄盡之計救涸轍之鮒而挾西江之水療七年之病而求三年之艾均可謂不識時宜鹵莽滅裂者矣奈何從事於此者不思絲絲入籠耶或謂陰陽必相入而後得成和是固然矣第相入不徒恃巽順也如易大傳雖以巽爲入春秋傳之入猶可以順釋之歟是何不可之與有夫外之師而克入必其內有釁內之人旣出而復得入必其內有應今試以篇中實證附之外師之入虛證附之出者之入焉有無釁而可攻無應而得還者歟釁者民心之不順其上而固結焉者也應者民心之不忘於我而繫戀焉者也

因其不順而損之因其不忘而益之非與順以入之
之謂歟說者謂堯舜是順民之心湯武是逆取順守
然易大傳不又曰湯武革命順天而應人乎是知成
和必以相入相入必以順也

勞復

鼠糞微寒○時行勞復

鼓寒

竹瀝大寒○胃中大熱煩悶

人糞汁寒○時行大熱狂走解諸毒

蜀本大黃大寒

葱白平

犀角寒

防已平

虎掌溫

牡蠣微寒。○除榮衛虛熱去來不定

生薑微溫

石膏大寒。○主時疾擁熱

龜甲平

茈胡平微寒

麥蘗冬平微寒

差後勞復元氣正傷病體增病自宜益劇則堵禦之
方補救之術應加廣矣奈何仲景弁髦視之寥寥數

本經序疏要

卷一

无

則且并陰陽易差後勞復食復之治胥在焉可不謂太簡乎殊不知傷寒正病外別六淫內析六經推極其變固已毫無罅漏但既係病愈復病則必有復病著象故更隨象設法以示人就地剷除之義蓋六經正文已要其終此則更原其始耳倘不應時獲驗而更變幻披猖不仍有六經正文在乎是篇繼述仲景之志剖析仲景之義尤妙在不卽不離間直謂全在藕斷絲連草蛇灰綫處遺下陰陽偏勝隨所激動而觸發焉故此數味之中汗下清和無非當時對證之治而跬步不離病後復病之旨觀其於由痰由溼由熱由蔽在氣在血總若因陳幹而發新枝者可不謂

脫胎仲景別樹新義者耶要之復病之流詎止於是
儻別現他證仍隨證索治可矣

溫瘧

常山寒微寒○溫瘧胷中痰結吐逆

蜀漆平微溫○瘧腹中堅癥痞結

牡蠣平微寒○溫瘧洒洒驚恚怒氣

鼈甲平○溫瘧血瘕腰痛

麝香溫○溫瘧辟惡氣

麻黃溫微溫○溫瘧去邪熱氣

大青大寒

防葵寒○溫瘧驚邪狂走

豬苓平。○痰瘧利水道

防已平溫。○溫瘧熱氣利大小便

茵芋溫微溫。○溫瘧發作有時

藥性論

巴豆溫生溫熟寒。○溫瘧癥瘕結聚堅積畱飲痰癖

曰頭翁溫。○溫瘧狂易寒熱

女青平。○溫瘧辟不祥

芫花溫微溫。○鬼瘧

白薇平大寒。○溫瘧洒洒發作有時

松蘿平。○痰熱溫瘧可爲吐湯

蜀本天靈蓋平

堯花寒。○主傷寒溫瘧

茵陳蒿平。主瘡瘡。

日華

藥對龜甲平臣。療疥瘡。

小麥微寒。

躑躅溫使。主溫瘡。

白斂微寒。主溫瘡寒熱使。主小兒驚癇溫瘡。

蒴藿根溫使。

當歸溫。主瘡寒熱君。主溫瘡寒熱洒洒在皮膚中。

竹葉平。合常山煮。主孩子久瘡。極良。雞子黃和常山。

爲凡用竹葉湯下。主久瘡。

證類桃仁平。

烏梅平。治瘡方多用之。

雄黃平大溫

菖蒲溫。小兒溫瘧身積熱不可解可作浴湯

莽草溫

曰標溫瘧舉瘧瘧瘧瘧鬼瘧瘧寒熱而胥附焉何也夫瘧瘧瘧瘧鬼瘧瘧寒熱之混於溫瘧猶時行溫疫瘧熱之混於傷寒矣古人別病極嚴凡相似而析者不徒析也必其同中有異不相似而合者不徒合也必其異中有同是故傷寒時行溫疫瘧熱之合以其皆屬陰陽相拒溫瘧瘧瘧瘧瘧瘧鬼瘧瘧寒熱之合以其皆屬陰陽相爭耳夫陰陽相爭則分理其陰陽可矣乃劫痰行水利溼之物且居其半何哉殊不知此

正分理陰陽微意所在也素問瘧論大旨邪藏骨髓之中不與陽俱出而隨陰偕行出則并於陽以與陰爭爲熱復入則并於陰以與陽爭爲寒者爲溫瘧陽加於陰陽逐陰行者謂之汗則溫瘧之邪固依水爲行止者也淒愴寒水藏於腠理復感於風雨氣相搏伏衛氣經行之所屈衛氣來先受者先動則風并於水而寒後感者後動則水并於風而熱者爲瘧寒熱必得汗而熱始解則瘧寒熱之邪亦依水爲行止者也特溫瘧之汗當其始瘧寒熱之汗當其終耳靈樞五癰津液別篇謂天暑衣厚爲汗天寒衣薄爲溺與氣則汗與小水本係一氣所化而翕張於外則有去

有來通輸於下則往而不反是治瘧者多半以劫痰
行水利溼又何疑焉觀篇中卽非劫痰行水利溼者
其旋轉陰陽每於闔闢翕張之處緩其陽之怒以撓
陰而於結聚痞滿之中洩其陰之阻以激陽其使外
達者又每跬步設防俾能出不能復入以就其徹底
畢達之功其與他外感爲寒熱者界劃分明無少混
淆是其綱舉目張有條不紊爲何如哉若夫瘴瘧鬼
瘧卽瘧寒熱之偶兼他癘者瘵瘧卽瘧寒熱之久而
不已者皆陰陽相爭者之支流餘派如癰瘡雖亦起
落有時卽不入焉則以其單熱無寒非陰陽相爭耳
故斥之

然則明人所創治瘧方謂使邪離於陰陽者非極善之法歟夫其所謂用風藥之甘辛氣清者以升陽氣使離於陰而寒已用苦甘寒引陰氣下降使離於陽而熱已者是使陰陽相離非使邪與陰陽相離也使邪與陰陽相離猶可言人身陰陽可使之相離乎且瘧論明言瘧由暑熱氣藏於營氣之舍寒水氣舍於皮膚之內而其所用甘辛氣清風藥芷胡升麻葛根羌活防風果可使藏於營氣之舍者離乎其所用苦甘寒石膏知母甘草粳米果可使舍於皮膚之內者離乎吾正恐其在外之陰邪愈加蔽痼在內之陽邪益難升發兩氣互阻馴至寒不成寒熱不成熱決裂

潰敗耳烏得云極善之法哉嗟嗟土苴古法芻狗經
方非一日矣太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒
熱多寒少一日二三度發身癢者與桂枝麻黃各半
湯服桂枝湯後形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝
二麻黃一湯之文何嘗不在傷寒論何嘗不使邪氣
與陰陽相離芫胡去半夏加栝樓根湯治瘧病發渴
亦治勞瘧芫胡桂枝乾薑湯治瘧多寒微有熱或但
寒不熱之文何嘗不在金匱要略亦何嘗不使邪與
陰陽相離擴而充之則皮膚之內邪氣盛者大小芫
胡芫胡桂枝小芫胡加芒消加龍骨牡蠣亦何者不
可用乎每於瘧來時先嘔者用半夏瀉心吐瀉交作

者用生薑瀉心胃痞下利者用甘草瀉心汗多腹脹
滿者用厚朴生薑甘草半夏人瀉腹滿痛者用桂枝
加芍藥皆應如桴鼓若更參此篇以逗引其陰陽抉
摘其巢窟當益便利如指而必杜撰成方以示古法
經方之可唾棄耶且夫邪之陰陽與人身之陰陽不
能不相從猶水之必流溼火之必就燥不能強之使
違也况邪能與陰陽相并而爲旋轉之樞耶相并者
能相入也能相入原係人身陰陽生化之機故瘧雖
久多不致死特能相入而不能相和故每連月浹旬
不能驟解以其開者自爲開闔者自爲闔而不能相
顧耳倘使闔中有開能拒邪而不拒正開中有闔能

本經序疏要

卷一

三

人正而不入邪斯開闔之間陰陽日相聯絡邪氣日
益零落愈病之機遂可把握故本篇之用介類實皆
取意於翕闔之中以挫其邪較之取意於使邪與陰
陽相離者明眼觀之自有以知其不侔矣

本經序疏要卷一